Learning Channel (Pty) Ltd
3rd Floor, The Mills
66 Carr Street
Newtown
Johannesburg
(011) 639-0179

Website: www.learn.co.za

Nasionale Seniorsertifikaat
Graad 12
Wiskunde
Vraestel 1

MEMORANDUM





1.1 1.1.1 $2x^2 + 7x = 30$

$2x^2 + 7x - 30 = 0$ ✓

$(2x - 5)(x + 6) = 0$ ✓

$\therefore x = 25$ of $x = -6$ ✓✓ (4)

1.1.2 $2x(x - 2) - 5 = 0$

$2x^2 - 4x - 5 = 0$ ✓

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{4 \pm \sqrt{(-4)^2 - 4 \times (2)(-5)}}{2 \times 2}$$ ✓

$$\therefore x = \frac{4 + \sqrt{56}}{4} \text{ of } x = \frac{4 - \sqrt{56}}{4}$$ ✓✓

Of $x = 2{,}87$ of $x = -0{,}87$ (4)

1.1.3 $4x^2 + 5x - 2 < 0$

$(4x - 1)(x + 2) < 0$ ✓✓

$x < \frac{1}{4}$ of $x > -2$ ✓✓ (4)

1.2 1.2.1 $2x + 6 - y = 0$

$2x + 6 = y$

$y + 3x^2 = 8x + 3$

$y = -3x^2 + 8x + 3$ ✓

$\therefore 2x + 6 = -3x^2 + 8x + 3$ ✓

$3x^2 - 6x + 3 = 0$

$x^2 - 2x + 1 = 0$

$(x - 1)^2 = 0$ ✓

$\therefore x = 1$ ✓

$\therefore y = 2x + 6 = 8$ ✓ (5)

1.2.2



✓

(1; 8) is die kontakpunt tussen die reguitlyn $y = 2x + 6$ en die parabool $y = -3x^2 + 8x + 3$. Daar is een kontakpunt.

$\Rightarrow$ lyn is 'n raaklyn aan die kromme. ✓✓ (3)

2.1
$$P = \frac{x[1-(1+i)^{-n}]}{i}\checkmark$$

$$800\,000 = \frac{7\,500\left[1-\left(1+\frac{\frac{9}{100}}{12}\right)^{-n}\right]}{\frac{\frac{9}{100}}{12}}\checkmark\checkmark$$

$$800\,000 = \frac{7\,500\left[1-\left(1+\frac{3}{400}\right)^{-n}\right]}{\frac{3}{400}}$$

$$800\,000 \times \frac{3}{400} \div 7\,500 = 1-\left(\frac{403}{400}\right)^{-n}$$

$$\frac{20}{25} = 1-\left(\frac{403}{400}\right)^{-n}\ \checkmark$$

$$\left(\frac{403}{400}\right)^{-n} = \frac{5}{25}$$

$$= \frac{1}{5}$$

$$-n = \left[\frac{\log\frac{1}{5}}{\log\frac{403}{400}}\right]\checkmark$$

$$-n = -215{,}4 \text{ maande } \checkmark$$

$\therefore$ Dit sal 7,95 jaar neem om die lening terug te betaal. ✓

(Dit is onnodig om by verskillende stadia te vereenvoudig.) (7)

2.2 2.2.1 $A = P(1-i)^n\checkmark$

$A = 1\,500\,000\left(1-\frac{18}{100}\right)^5\checkmark$

$A = 556\,109{,}76\checkmark$

$\therefore$ Dit is R556 109,76 werd. (3)

2.2.2 $A = P(1-i)^n$✓

$A = 1\ 500\ 000\left(1+\frac{4,5}{100}\right)^5$✓

$A = 1\ 869\ 272,91$✓

∴ Delgingsfonds wat benodig word is:

R1 869 272,91 – R556 109,76 = R1 313 163,15✓ (4)

2.2.3 $$F = \frac{x[(1+i)^2-1]}{i}$$✓

$$1\ 313\ 163,15 = \frac{x\left[\left(1+\frac{\frac{6}{100}}{12}\right)^5-1\right]}{\frac{\frac{6}{100}}{12}}$$✓✓

$$\frac{1\ 313\ 163,15 \times 6 \div 100 \div 12}{\left[\left(1+\frac{\frac{6}{100}}{12}\right)^5-1\right]} = x$$✓

$$260\ 019,40 = x$$✓

∴ Hulle sal R260 019,40 per maand moet betaal. (5)

3.1 3.1.1 Kwadratiese ry ✓ (1)

3.1.2

T_0	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5
9	9	11	15	21	29
	0	2	4	6	8
		2	2	2	2

Tweede verskil = 2

$\therefore 2a = 2$

$a = 1$✓

Deur inspeksie $T_0 = 9$

$\therefore c = 9$✓

$\therefore T_n = n^2 + bn + 9$

$T_1 = 1^2 + b + 9 = 9$

$\therefore b = -1$✓

$\therefore T_n = n^2 - n + 9$✓

(of soortgelyke metode) (4)

3.2 Sammy:

$a = 2 \quad T_4 = a + 3d$ ✓

$= 2 + 3d = 17$

$3d = 15$

$d = 5$✓

$\therefore T_{20} = a + 19d$

$= 2 + 19 \times 5$

$= 97$

$\therefore x = 97$✓

Solly:

$T_4 = a + 3d = 59$

$T_{20} = a + 19d = 107$✓

$16d = 48$

$d = 3$✓

$\therefore T_4 = a + 3d = 59$

$a + 9 = 59$

$a = 50$✓

$\therefore y = 50$ (6)

4.1 4.1.1 2010

109% van 85 000 = R92 650✓

109% van 92 650 = R100 988,50✓ (2)

4.1.2 MR met $a = 85\,000$

$r = 109\% = 1{,}09$✓

$T_n = ar^{n-1}$✓

$T_{15} = 85\,000(1{,}09)^{15}$✓

$= R309\,611{,}01$✓ (4)

4.2 $\sum_{k=0}^{3} x = \frac{2}{5^k}$

$= 2 + 25 + 225 + 2\,125$✓✓

$= \frac{312}{125}(2{,}496)$ ✓ (3)

4.3 4.3.1 MR met $a = 20$

$r = \frac{3}{4}$

$S_n = \frac{a[1 - r^n]}{1 - r}$✓

$S_n = \frac{20\left[1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{10}\right]}{1 - \frac{3}{4}}$✓

$= 75{,}49$✓

$\therefore$ Diepte is 75,49 m. (3)

4.3.2 $S_\infty = \frac{a}{1-r}$✓

$= \frac{20}{1-\frac{3}{4}}$✓

$= 80$

$s_\infty = 80$ m✓

∴ Maatskappy sal nooit die water bereik nie. ✓ (4)

5.1 5.1.1 $f(x) = \frac{-3}{x-1} + 2$

asimptoot by $x = 1$; $y = 2$

y-asimptoot: $x = 0$ ∴ $f(0) = \frac{-3}{0-1} + 2 = 5$

x-asimptoot: $y = 0$ ∴ $0 = \frac{-3}{x-1} + 2$

$\frac{3}{x-1} = 2$

$3 = 2x - 2$

$5 = 2x$

$\frac{5}{2} = x$



✓✓✓✓ (4)

5.1.2 Simmetrie-as:

$y = x + c$ en $y = -x + c$

Gaan deur (1; 2) ✓

∴ $2 = 1 + c$ $2 = -1 + c$

$1 = c$ $3 = c$

∴ $y = x + 1$ en $y = -x + 3$✓✓ (3)

5.2 5.2.1 $y = a(x - x_1)(x - x_2)$ ✓

$y = a(x + 1)(x - 3)$ ✓

Vervang (0; –1):

$-1 = a(0 + 1)(0 - 3)$ ✓

$-1 = -3a$

$\frac{1}{3} = a$✓

$\therefore p(x) = \frac{1}{3}(x + 1)(x - 3)$

$= \frac{1}{3}(x^2 - 2x - 3)$

$= \frac{1}{3}x^2 - \frac{2}{3}x - 1$✓ (5)

5.2.2 $q(x) = 12b^x - 4$

Vervang (3; 0):

$0 = \frac{1}{2}b^3 - 4$✓

$4 = \frac{1}{2}b^3$

$8 = b^3$✓

$2 = b$ (2)

5.2.3 Definisieversameling: $x \in \mathbb{R}$ ✓

Waardeversameling: $y \in \mathbb{R}; y > -4$ ✓ (2)

5.2.4 $q(x) = y = \frac{1}{2} \cdot 2^x - 4$

$q^{-1}(x)$: $x = \frac{1}{2} \cdot 2^y - 4$✓

$2x = 2^y - 8$

$2x + 8 = 2^y$✓

$\therefore y = \log_2 (2x + 8)$ ✓

$q^{-1}(x) = \log_2 (2x + 8)$ (3)

5.2.5 Definisieversameling van $q^{-1}(x)$ = Waardeversameling van $q(x)$

$= x \in \mathbb{R}; x > -4$ ✓ (1)

5.3 5.3.1 $a = -4$✓ (1)

5.3.2 $x = 180°; x = -180°$ ✓

$x = 0°$✓ (2)

5.3.3 $y = \tan (x + 90° + 45°) + 2$✓

$y = \tan (x + 135°) + 2$✓

of $y = \tan (x - 45°) + 2$

deur inspeksie/reduksie (2)

6.1 $f(x) = \frac{1}{2}x^2$

$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$

$\therefore f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{\frac{1}{2}(x+h)^2 - \frac{1}{2}x^2}{h}$ ✓

$\therefore f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{\frac{1}{2}x^2 + xh + \frac{1}{2}h^2 - \frac{1}{2}x^2}{h}$ ✓

$\therefore f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{h\left(x + \frac{1}{2}h\right)}{h}$ ✓

$f'(x) = \lim_{h \to 0} x + \frac{1}{2}h$ ✓

$f(x) = x$ ✓ (5)

6.2 6.2.1 $f(x) = x^4 + \sqrt{x} - \frac{9}{x}$

$f(x) = x^4 + x^{\frac{1}{2}} - x^{-1}$ ✓

$\therefore f'(x) = 4x^3 + \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} - 9x^{-2}$ ✓✓ (3)

6.2.2 $y = t(t+1)$

$y = 3x(3x+1)$ ✓

$y = 9x^2 + 3x$ ✓

$\therefore \frac{dy}{dx} = 18x + 3$ ✓ (3)

6.3 6.3.1 $A(x) = -12x^3 + 12x^2$

$A'(x) = -32x^2 + 24x$ ✓

$\therefore 0 = -32x^2 + 24x$ ✓

$0 = x^2 - 16x$ ✓

$0 = x(x - 16)$

$x = 0$ of $x = 16$

$\therefore$ Maksimum oppervlakte sal na 16 maande bedek word.a ✓ (4)

6.3.2 $A'(x) = -\frac{3}{2}x^2 + 24x$

$A'(1) = -\frac{3}{2}(1)^2 + 24(1)$ ✓

$= 22\frac{1}{2}$ ✓

$\therefore$ Die groeitempo was $22\frac{1}{2}$m^2/maand een maand nadat die studie begin is. (2)

7.1 $f(x) = x^3 - 4x^2 - 3x + 18$

$f(3) = 27 - (4 \times 9) - (3 \times 3) + 18 = 0$ ✓ (1)

7.2 $0 = x^3 - 4x^2 - 3x + 18$

$0 = (x-3)(x^2 - x - 6)$ ✓

$0 = (x-3)(x-3)(x+2)$ ✓

$\therefore x$-asimptote by $x = 3$ and $x = 2$ ✓✓ (4)

7.3 $f'(x) = 3x^2 - 8x - 3 = 0$ vir draaipunte ✓

$\therefore (3x + 1)(x - 3) = 0$

$x = -\frac{1}{3}$ en $x = 3$✓✓

$\therefore f(x) = \left(-\frac{1}{3}\right)^3 - 4\left(-\frac{1}{3}\right)^2 - 3\left(-\frac{1}{3}\right) + 18$

$= \frac{500}{27}$ (= 18,52) ✓

$f(3) = 0$

$\therefore$ Draaipunte by $\left(-\frac{1}{3}; \frac{500}{27}\right)$ en (3; 0). ✓ (5)

7.4



✓✓ vir elke punt (4)

7.5 $f''(x) = 6x - 8 = 0$✓

vir buigpunt.

$\therefore x = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$✓ (2)

8.1 V = Basisoppervlakte × Hoogte

$2{,}5 = x^2h$✓

$\frac{2.5}{x^2} = h$✓ (2)

8.2 Oppervlakte $= 2x^2 + 4xh$ ✓

$= 2x^2 + 4x \times \frac{2.5}{x^2}$✓

$= 2x^2 + \frac{10}{x}$✓ (3)

8.3 Oppervlakte $= 2x^2 + 10x^{-1}$✓

Oppervlakte $= 4x - 10x^{-2}$✓

$4x - \frac{10}{x^2} = 0$ (vir minimum) ✓

$4x^3 - 10 = 0$

$x^3 = \frac{10}{4}$

$x = \sqrt[3]{\frac{5}{2}}$✓

$x = 1{,}36$✓ (5)

9.1 x = aantal ghitare van tipe A

y = aantal ghitare van tipe B

$x + y \leq 20$✓

$1\,500x + 3\,000y \leq 45\,000$✓

$x \geq 6$✓

$y \geq 6$✓ (4)

9.2



✓✓✓✓✓ (5)

9.3 $P = 400x + 1\,000y$✓ (1)

9.4 $-400x + P = 1\,000y$

$-\frac{400}{1\,000}x + \frac{P}{1\,000} = y$

$-\frac{2}{5}x + \frac{P}{1\,000} = y$✓

$\therefore$ Gebruik soeklyn met helling $-\frac{2}{5}$ … sien skets. ✓

$\therefore$ Maksimum wins vir $x = 6$ en $y = 12$ by punt A. ✓ (3)

9.5 Nuwe winsvergelyking:

$P = 500x + 1\,000y$

$-\frac{500}{1\,000}x + \frac{P}{1\,000} = y$

$-\frac{1}{5}x + \frac{P}{1\,000} = y$✓

Hierdie lyn is ewewydig aan een van die grense van die uitvoerbaarheidsgebied. Derhalwe kom maksimum wins by enige heelgetalpunt op die lyn voor. ✓

d.i. A(6; 12)

B(8; 11)

C(10; 10) ✓ (3)